

## MONITORAGGIO GIORNALIERO DELLA IAD

### DATI GENERALI

Data ID

paziente

Iniziali dell'infermiere

### CLASSIFICAZIONE IAD

Classificazione IAD secondo GLOBIAD

- 1A Arrossamento persistente senza segni clinici di infezione
- 1B Arrossamento persistente con segni clinici di infezione
- 2A Perdita di cute senza segni clinici di infezione
- 2B Perdita di cute con segni clinici di infezione

### ARROSSAMENTO PERSISTENTE


Indicare i riquadri in cui si osserva arrossamento persistente



% di arrossamento

### PERDITA DI PELLE

Indicare i riquadri in cui si osserva perdita di cute



% di perdita di cute

### EDEMA E MACERAZIONE

- È presente edema, la pelle risulta tesa o gonfia alla palpazione
- Pelle macerata

### SEGNI DI INFEZIONE

- Lesioni satellite (pustole che circondano la lesione, indicative di un'infezione fungina da *Candida albicans*)
- Desquamazione bianca della cute circostante (che suggerisce un'infezione fungina)
- Cambiamenti di colore nel letto della ferita (come verde, giallo, marrone, grigiastro)
- Essudato purulento (pus)  Livello eccessivo di essudato

### SINTOMI DI INFEZIONE RIFERITI DAL PAZIENTE

Correlati IAD

- Prurito
- Formicolio
- Bruciore
- Dolore

Intensità del dolore correlato alla IAD tramite scala di valutazione numerica



Non è possibile compilare l'autovalutazione