GLOBIAD

Ghent Global IAD Categorisation Tool

MONITORAMENTO DIÁRIO DA DAI

DADOS GERAIS

Data

Registrodo paciente

Iniciais da enfermeiro

IAD CATEGORISATION

Categorização da DAI de acordo com o GLOBIAD

- ☐ 1A Hiperemia persistente sem sinais clínicos de infecção
- ☐ 1B Hiperemia persistente com sinais clínicos de infecção
- ☐ 2A Perda de pele sem sinais clínicos de infecção
- ☐ 2B Perda de pele com sinais clínicos de infecção

HIPEREMIA PERSISTENTE

Indique os quadrados onde observa hiperemia persistente



☐ % de hiperemia

PERDA DE PELE

Indique os quadrados onde você observa perda de pele



☐ % de perda de pele

EDEMA E MACERAÇÃO

- ☐ Presença de edema; a pele parece tensa ou inchada à palpação
- ☐ Pele macerada

SINAIS DE INFECÇÃO

- ☐ Lesões satélites (pústulas ao redor da lesão, sugerindo uma infecção fúngica por Candida albicans
- ☐ Descamamento branco da pele ao redor (sugerindo uma infecção fúngica)
- ☐ Alterações na cor do leito da ferida (como verde, amarelo, marrom, acinzentado
- ☐ Exsudato purulento (pus)
- ☐ Nível excessivo de exsudato

EXPERIÊNCIA DO PACIENTE

Relacionado à DAI

- ☐ Coceira
- ☐ Formigamento
- ☐ Ardor
- ☐ Dor

Intensidade da dor relacionada à DAI por meio da Escala Numérica de Avaliação



☐ Não é possível realizar um autorelato.